

БАЗИРОН АС

бензоила пероксид

ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата

БАЗИРОН АС
BASIRON® АС

Регистрационное удостоверение: П N014057/ 01

Торговое название препарата: Базирон АС

Международное непатентованное название или группировочное название: бензоила пероксид

Лекарственная форма: гель для наружного применения

СОСТАВ:

в 100 г геля содержится

действующее вещество: бензоила пероксид водный (в пересчете на бензоила пероксид безводный)

Базирон АС 2,5 % – 2,5 г,

Базирон АС 5,0 % – 5,0 г,

Базирон АС 10,0 % – 10,0 г;

вспомогательные вещества: метакриловой кислоты сополимер, полоксамер 182, карбомер 940, глицерол, динатрия эдетат, докузат натрия, пропиленгликоль, кремния диоксид коллоидный, натрия гидроксид, вода очищенная.

ОПИСАНИЕ

Белый гомогенный гель.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

Антисептическое средство.

КОД АТХ - D 10 AE 01.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бензоила пероксид проявляет противомикробную активность в отношении *Propionibacterium acnes* и *Staphylococcus epidermidis*. Оказывает кератолитическое действие, улучшает оксигенацию тканей, подавляет продукцию кожного сала в сальных железах.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Проникновение бензоила пероксида через кожу низко. Основная часть бензоила пероксида превращается в бензойную кислоту, которая после абсорбции попадает в системный кровоток и быстро выводится почками. Отсутствует кумуляция в тканях. Накожное применение Базирона АС в терапевтических дозах не приводит к побочным эффектам системного действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Угревая сыпь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному из входящих ингредиентов препарата. Дети до 12 лет.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Контролируемых клинических испытаний применения препарата при беременности и лактации не проводилось. За длительное время клинического применения Базирона АС не было отмечено случаев токсического действия на плод или пороков развития.

Применение геля Базирона АС при беременности и кормлении грудным молоком возможно в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Легким прикосновением равномерно наносить гель на пораженную поверхность один или два раза в день (утром и вечером) на чистую сухую кожу. Терапевтический эффект развивается после 4 недель лечения, стойкое улучшение после 3-х месячного лечения.

Повторный курс лечения возможен после консультации с врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях местное раздражение (покраснение, шелушение, сухость кожи, чувство жжения). В таких случаях рекомендуется сократить частоту применения.

В редких случаях может возникать аллергический контактный дерматит.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Избегать попадания Базирона АС геля на слизистые оболочки глаз, рта и носа. При случайном попадании препарата на слизистые тщательно промыть их теплой водой.

Не рекомендуется одновременное использование средств с отшелушивающим, подсушивающим или раздражающим эффектом (например средства, содержащие спирт).

Не рекомендуется солнечное и ультрафиолетовое облучение, которые являются дополнительной причиной раздражения кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель для наружного применения 2,5%, 5%, 10% по 40г в тубе из полиэтилена низкой плотности с плотно завинчивающейся крышкой. Одну тубу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Название и адрес производителя:

Laboratoires Galderma, France,

Zone Industrielle Montdesir,

74540 Alby sur Cheran, France.

Лаборатории Галдерма, Франция,

Зон Индустриель, Монтдезир,

74540 Альби сюр Шеран, Франция.

Претензии потребителей направлять по адресу:

Представительство общества «Галдерма СА» (Швейцария) в России,

107076 Москва, Стромынский переулок, 6, офис 220.

Телефон / факс: + 7 (495) 269-15-96.