

ДИФФЕРИН®

адапален

ГЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата ДИФФЕРИН®/DIFFERIN®

Регистрационное удостоверение: П N012654/01

Торговое название: дифферин

Международное непатентованное название: адапален

Лекарственная форма: гель для наружного применения

СОСТАВ ПРЕПАРАТА: на 1 г геля

Активное вещество: адапален 1,0 мг.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилпарагидроксисбензоат, феноксиэтанол, карбомер 940 Р, динатрия эдетат полоксамер 182, натрия гидроксид, вода очищенная.

ОПИСАНИЕ: гель белого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Угревой сыпи средство лечения.

Код АТХ: (D 10AD 03)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Адапален - метаболит ретиноида, обладает комедонолитической и противовоспалительной активностью, нормализует процессы кератинизации и эпидермальной дифференцировки. Механизм действия адапалена основан на взаимодействии со специфическими у-рецепторами эпидермальных клеток кожи. В результате действия адапалена, в частности, происходит снижение «сцепленности» эпителиальных клеток в устье сально-волосяного фолликула и уменьшение предпосылок для образования микрокомедонов. Адапален оказывает противовоспалительное действие *in vivo* и *in vitro*, воздействуя на факторы воспаления путем ингибирования миграции лейкоцитов в очаге воспаления и метаболизма арахидоновой кислоты.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Абсорбция адапалена через кожу очень низка (около 4 % применяемой дозы). Экскреция из организма происходит, главным образом, через желчь.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Угревая сыпь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному из ингредиентов препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Не рекомендуется применение препарата во время беременности и грудного вскармливания.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

Дерматит, экзема.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Легким прикосновением равномерно наносить гель на пораженную поверхность один раз в день перед сном на чистую сухую кожу, избегая попадания геля в глаза и на губы. Терапевтический эффект развивается после 4-8 недель лечения, стойкое улучшение после 3-х месячного лечения. В некоторых случаях из-за кратковременного раздражения кожи может быть сокращено число аппликаций или лечение приостановлено до исчезновения признаков раздражения. Повторный курс лечения возможен после консультации с врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Раздражение кожи (лечение необходимо приостановить до исчезновения раздражения кожи или сократить частоту применения).

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Поскольку препарат не взаимодействует с кислородом и не разрушается под действием света, его можно применять с другими местными и системными препаратами для лечения угревой сыпи, такими, как клиндамицина фосфат или бензоила пероксид.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Избегать попадания геля в глаза и на губы.

При случайном попадании препарата на слизистые оболочки глаз, рта или носа тщательно промыть их тёплой водой. Избегать прямых солнечных лучей, т.к. может появиться легкое раздражение кожи. Лечение может быть продолжено, если солнечная экспозиция сведена к минимуму (использование солнцезащитных очков и шляп). Не рекомендуется одновременное использование косметических средств с подсушивающим и раздражающим эффектом на кожу (например, духи или алкогольсодержащие средства). Адапален, наносимый на кожу вечером, можно сочетать с препаратами для лечения угрей, применяемыми утром.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Передозировка маловероятна.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель для наружного применения 0,1 % по 30г в полиэтиленовой тубе низкой плотности, плотно закручивающейся полипропиленовой крышкой. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25°C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Производитель:

Laboratoires Galderma, France

Zone Industrielle, Montdesire 74540 Alby sur Cheran,

France Лаборатории Галдерма, Франция

Зон Индустриель, Монтдесир 74540 Альби сюр Шеран, Франция

Представительство Галдерма СА, Швейцария, в Российской Федерации

107076 Москва, Стромьинский переулок, 6.

Тел./факс: +7 (495) 269-15-96

GALDERMA



P22709-2