

ЛОЦЕРИЛ®

аморолфин 5%

РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЛОЦЕРИЛ®
LOCERYL®

Регистрационное удостоверение № П N 012558/01 от 25.11.2005,

Торговое название: лоцерил.

Международное непатентованное название: аморолфин,

Лекарственная форма: раствор для наружного применения,

СОСТАВ: В 1 грамме препарата содержится:

Действующее вещество: аморолфина гидрохлорид - 64,0 мг, (соответствует 55,74 мг/мл), что соответствует аморолфина основанию - 57,4 мг, (соответствует 50,0 мг/мл)

Вспомогательные вещества: аммониевый сополимер метакрилата, триацетат глицерин, этилацетат, бутилацетат, этанол безводный.

ОПИСАНИЕ: прозрачная, бесцветная или почти бесцветная жидкость.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противогрибковое средство.

Код АТХ (D01AE16)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противогрибковый препарат для наружного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленное повреждением цитоплазматической мембраны гриба путём нарушения биосинтеза стеролов. Обладает широким спектром действия, активен в отношении грибов рода *Trichophyton*, *Candida*, *Pityrosporum*, *Cryptococcus*, *Mycrosporum*, *Epidermophyton*, *Alternaria*, *Hendersonula*, *Scopulariopsis*, *Cladosporium*, *Fonseceae*, *Wangiella*, *Coccidioides*, *Histoplasma*, *Sporothrix*.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При нанесении на ногти проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе (практически полностью в течение первых 24 часов). Эффективная концентрация сохраняется в поражённой ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация в плазме находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- лечение поражений ногтей, вызванных различными видами грибов (в том случае, если поражено не более 2/3 ногтевой пластины);
- профилактика грибковых поражений ногтей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


Повышенная чувствительность к препарату

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Наносить на поражённые ногти пальцев рук или ног 12 раз в неделю следующим образом:



1 До применения препарата удалить по возможности поражённые участки ногтя (особенно на его поверхности) с помощью прилагаемой пилки для ногтей.




2. Затем поверхность ногтя очистить и обезжирить прилагаемым тампоном, смоченным спиртом.



3. Обмакнуть лопаточку в раствор. Лопаточку следует вынуть из флакона, не касаясь его горлышка, не следует стирать излишки раствора о горлышко флакона.



4. Раствор наносить на всю поверхность поражённого ногтя с помощью лопаточки. Вышеописанную процедуру повторить для каждого поражённого ногтя.



5. Протереть горлышко флакона чистым тампоном, каким обрабатывали ноготь. Плотнo закрыть флакон сразу же после использования.



6. Дать раствору высохнуть примерно в течение 3-х минут.



7. Лопаточку протереть использованным тампоном. Избегать контакта обработанных ногтей и тампона. Использованный тампон выбросить.

Лечение следует продолжать до регенерации ногтя и полного излечения поражённого участка.

Средняя длительность лечения составляет 6 месяцев для ногтей на руках и 9-12 месяцев для ногтей на ногах.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Жжение в области ногтей, эритема и зуд (на местах аппликаций).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Не рекомендуется применение препарата во время беременности и лактации.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Клинические данные по применению препарата у детей отсутствуют, поэтому его не следует назначать детям.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не установлено.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- пилки, использованные для обработки поражённых ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей;
- лица, работающие с органическими растворителями, должны надевать непроницаемые перчатки для защиты ногтей, покрытых раствором;
- во время лечения следует избегать применения накладных искусственных ногтей и не пользоваться косметическим лаком для ногтей;
- тампон содержит легковоспламеняющееся вещество.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 2,5 мл и 5,0 мл во флаконах из темного стекла с вкладышем из полимерного материала, предохраняющим препарат от высыхания. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению, 10 пластиковыми лопаточками, уложенными в ряд и фиксированными в рамке, 30 тампонами, смоченными изопропиловым спиртом, (в герметично запаянных конвертах из ламинированной алюминиевой фольги) и 30 пилками помещают в картонную коробку.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 30°C, в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта

Производитель: Лаборатории ГАЛДЕРМА, Франция

Зон Индустриель, Монтдесир
74540, Альби сюр Шеран, Франция

Laboratoires Galderma, France
Zone Industrielle, Montdesir
74540, Alby-sur-Cheran, France

Претензии потребителей направлять по адресу:
Представительство Галдерма СА, Швейцария, в РФ.
107076, Москва, Стромьинский переулок, 6.
телефон/факс 7 (495) 269-15-96

GALDERMA